



Red de Atención y Apoyo a las Familias

 **FIAPAS**
Familias de Personas Sordas

ANDALUCÍA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FAPAS
Tel.: 95 409 52 73 (Sevilla)

ASPASA-ALMERÍA
Tel.: 950 24 47 90

ASPAS-CÓRDOBA
Tels.: 957 76 48 68
628 709 345

ASPRODES-GRANADA
Tel.: 958 22 20 82

ASPRODESORDOS-HUELVA
Tel.: 959 26 22 90

AFAIS-JAÉN
Tel.: 953 08 84 82

ASPANSOR-MÁLAGA
Tel.: 95 265 17 31

ASPAS-SEVILLA
Tel.: 95 493 28 24

ARAGÓN (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FAAPAS
Tel.: 974 22 77 83 (Huesca)

**ASOCIACIÓN "SAN FRANCISCO
DE SALES"-HUESCA**
Tel.: 974 22 77 83

ATPANSOR-TERUEL
Tel.: 978 61 03 23

ASPANSOR-ZARAGOZA
Tels.: 976 25 50 00
608 068 041

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

APADA-ASTURIAS
Tels.: 98 522 88 61
684 609 893

BALEARES I. (COMUNIDAD AUTÓNOMA)

FUNDACIÓN ASPAS-MALLORCA
Tel.: 870 57 00 73

CANARIAS (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FUNCASOR
Tel.: 922 54 40 52 (Tenerife)
Tel.: 928 23 32 89 (Las Palmas)

CASTILLA-LA MANCHA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FASPAS
Tels.: 925 71 33 56 (Toledo)
691 40 12 43

ASPAS-ALBACETE
Tel.: 967 55 89 12

ASPAS-CIUDAD REAL
Tels.: 926 22 00 95
617 381 258

ASPAS-CUENCA
Tel.: 608 393 099

APANDAGU-GUADALAJARA
Tel.: 655 670 327

APANDAPT-TOLEDO
Tel.: 925 22 46 93

CASTILLA Y LEÓN (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FAPAS
Tels.: 947 46 05 40 (Burgos)
658 649 979

ARANS-BUR-BURGOS
Tels.: 947 46 05 40
627 704 538

ASFAS-LEÓN
Tel.: 665 66 55 25

ASPAS-SALAMANCA
Tel.: 923 21 55 09

ASPAS-VALLADOLID
Tel.: 983 39 53 08

CATALUÑA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN ACAPPS
Tel.: 93 210 55 30 (Barcelona)

ACAPPS-BARCELONA
Tel.-Fax: 93 210 55 30

ACAPPS-LLEIDA
Tel.: 685 801 973

C. VALENCIANA

FEDERACIÓN HELIX-C.V.
Tel.: 96 391 94 63 (Valencia)

APANAH-ELDA
Tel.: 96 698 22 49

APANAS-ASPE
Tel.: 96 549 00 77

ASPAS-CASTELLÓN
Tel.: 964 05 66 44

ASPAS-VALENCIA
Tel.: 96 392 59 48

EXTREMADURA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FEDAPAS
Tel.: 924 30 14 30 (Badajoz)

ADABA-BADAJÓZ
Tel.: 924 24 26 26

ASCAPAS-PLASENCIA
Tel.: 927 41 35 04

GALICIA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ACOPROS-LA CORUÑA
Tel.: 881 91 40 78

LA RIOJA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ADARI-LA RIOJA
Tel.: 618 953 218

MADRID (COMUNIDAD DE)

**ASOCIACIÓN ENTENDER Y
HABLAR-MADRID**
Tel.: 91 735 51 60

ASPAS-MADRID
Tels.: 91 725 07 45
628 466 873

MURCIA (REGIÓN DE)

FEDERACIÓN FASEN
Tel.: 968 52 37 52 (Cartagena)
669 43 30 07

ASPANPAL-MURCIA
Tels.: 968 24 83 92
666 734 350

APANDA-CARTAGENA
Tel.: 968 52 37 52

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

EUNATE-NAVARRA
Tel.: 948 26 18 77


PAÍS VASCO (COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL)

ASPASOR-ÁLAVA
Tel.: 945 28 73 92

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

ACEPAS-CEUTA
Tel.: 956 50 50 55


PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA SORDERA POR OTOTÓXICOS



ACCEDER A LA EDICIÓN EN INGLÉS

- La sordera por ototoxicidad es un posible efecto secundario de ciertos medicamentos que se emplean con eficacia para tratar importantes enfermedades. Su detección precoz y adecuado tratamiento evita las secuelas asociadas a la misma, especialmente en la población infantil.
- Hoy en día es inexcusable realizar una valoración auditiva adecuada en tres momentos: antes de iniciar el tratamiento con el fármaco ototóxico, durante su administración (derivados del platino) y tras finalizarla.
- El propósito de esta monitorización auditiva es detectar precozmente una sordera para modificar, si es posible, el tratamiento con el ototóxico y para realizar un seguimiento de los pacientes a largo plazo, ya que la sordera puede aparecer incluso años después de la administración del ototóxico.

Valoración Audiológica



Gradación Ototoxicidad SIOP-Boston	
Grado 0	≤ 20 dB HL en todas las frecuencias
Grado 1	> 20 dB HL en 6 kHz o 8 kHz
Grado 2	> 20 dB HL en 4 kHz y en adelante
Grado 3	> 20 dB HL en 2 kHz o 3 kHz y en adelante
Grado 4	> 40 dB HL en 2 kHz y en adelante

Factores Genéticos

Hay que tener en cuenta que una pequeña proporción de la población infantil presenta mutaciones mitocondriales, responsables de una especial sensibilidad a la pérdida auditiva inducida por aminoglucósidos.

Están en estudio factores genéticos asociados a la toxicidad por derivados del platino.

Diagnóstico Serológico

Existen líneas de investigación orientadas a descubrir marcadores sanguíneos de daño coclear que anticipen la existencia de lesiones secundarias a la utilización de ototóxicos. Entre ellos destaca la determinación de proteínas exclusivas del oído interno y/o de microARN, que pueden ayudar a determinar el diagnóstico del tipo de lesión y tejido implicado.

Otoprotección

Una medida preventiva simple y útil para evitar mayor lesión por el fármaco sería reducir la dosis del mismo o variar la posología. Sin embargo, esto no siempre es posible y es necesario investigar variantes menos lesivas de los fármacos utilizados habitualmente.

La otoprotección farmacológica deriva de la posibilidad de utilizar fármacos con potencial para prevenir ototoxicidad de varios compuestos.

La administración de los otoprotectores puede ser sistémica, transtimpánica o por inhalación.

Los otoprotectores más estudiados basan su efecto en una acción antioxidante y/o antiinflamatoria.

* El contenido de este folleto es orientativo. La *lex artis* debe ajustarse en todo momento a los conocimientos más actualizados mediante el estudio de la literatura científica y adaptarse al contexto de cada niño/a.

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA SORDERA POR OTOTÓXICOS - 2020

Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia - CODEPEH

INDICACIÓN TRATAMIENTO OTOTÓXICO

- Valorar factores de riesgo de sordera
- Descartar sorderas preexistentes
- Considerar otras opciones de tratamiento no ototóxicas


ANTES

ESTUDIO AUDITIVO

- Audiometría Tonal
- Timpanometría
- DPOEA y/o PEAA

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE PLATINOS

Valoración sintomática y/o DPOEA



DESPUÉS

EVALUACIÓN TRAS CADA ADMINISTRACIÓN

- Batería Mínima SIOP-Boston
- DPOEA y/o PEAA

FÁRMACOS OTOTÓXICOS

Grupo farmacológico	Lugar de acción
Aminoglucósidos	→ Cóclea - Vestíbulo
Macrólidos	→ Cóclea
Glucopéptidos	→ N. Auditivo - Vestíbulo
Diuréticos de asa	→ Cóclea
Antimaláricos	→ Cóclea y/o Vestíbulo
Salicilatos	→ Cóclea
Derivados del platino	→ Cóclea y/o Vestíbulo

SEGUIMIENTO

ESTUDIO AUDIOLÓGICO con o sin ototoxicidad

- A la semana
- Al mes
- A los 6 meses
- Anual durante 10 años

OTOTOXICIDAD

INFORMAR

- Al profesional
- Al paciente y a la familia

REEVALUAR

- Tratamiento ototóxico

TRATAMIENTO

- Apoyo a la familia
- Rehabilitación auditiva
- Intervención logopédica
 - Audífonos
- Implantes auditivos
- Productos de apoyo



www.bibliotecafapias.es